


LA VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS : (E N'EST PAS QUE POUR LES FILLES.

LES PAPILLOMAVIRUS sont des virus **sexuellement transmissibles**. Ils se transmettent généralement dans les premières années suivant de début de l'activité sexuelle.

Certains d'entre eux, les papillomavirus oncogènes, ont la **capacité d'entraîner des cancers** :

- cancer du **col de l'utérus**, du vagin et de la vulve chez les femmes,
- mais également des cancers de la **gorge** et de l'**anus** dans les deux sexes et du **pénis** chez les hommes.



La haute autorité de santé recommande une **vaccination des filles et des garçons dès l'âge de 11 ans** avec un rattrapage possible jusque l'âge de 19 ans révolus, y compris chez les personnes immunodéprimées.

Chez les hommes ayant (ou ayant eu) des rapports sexuels avec des hommes, le rattrapage est étendu à l'âge de 26 ans révolus.

Deux vaccins sont disponibles mais il est recommandé d'initier cette vaccination avec le **GARDASIL 9®** car il protège contre un nombre plus élevé de types de papillomavirus oncogènes. Le schéma vaccinal se compose, selon l'âge, de 2 ou 3 injections :

- **2 injections jusqu'à 14 ans révolus,**
- **3 injections à partir de 15 ans.**

Pour plus d'information : rendez-vous sur le site vaccination-info-service.fr. et sur le site de [l'Institut national du cancer](http://l'institut-national-du-cancer).